

Rozšíření a početnost

Početnost rysů v Polsku je odhadována na asi 200 jedinců.

Tito dravci se vyskytují ve 2 hlavních útočištích: v jihovýchodní části státu (zejména Puszcza Białowieska, Kampinowska i Augustowska, asi 65 jedinců) a v Karpatech (asi 100 jedinců). V Polsku po roce 2000 provedeno první reintrodukce toho dravce v reintrodukce tego drapieznika w Puszczy Kampinoské a centrálním Polsku (Niedziałkowska et al. 2006). Skupina reintrodukovaných v Puszczy Kampinoské kocourů má asi 25 rysů. Reintrodukci se také provádí na Mazurach - v Puszczy Piské. (Krzywiński 2003). Několik jedinců se nachází také na Roztoczu. V posledních letech se pozoruje pomalou expanzi druhu na západ. Častější zjištění druhu v Sudetech dovolují odvozovat, že je tady nejpravděpodobněji stálým hostem (Flousek a jiné 2014). Není to ještě známá genetická příslušnost jedinců z jihozápadního Polska obývajících pohoří Sudet. Předpokládá se, že jsou to jedinci migrující z severního východu. Přítomnost rysů se poznamená odnedávna také v severozápadní části státu, mj. v Borach Tucholských, Słowińskim Národním Parku, a v poslední době také v nadnoteckých lesech. Schmidt (2011) určil aktuální rozsah populace rysa ve státu na 10,800 km² což je asi 12% lesní plochy v Polsku. Podle analýz GIS týkajících se stanovištních preferencí, potenciální rozsah výskytu druhu je 2,5 krát větší než teď (za Huck a jiné 2010).